

PHYSIQUE DES PARTICULES

Julien Cogan (CPPM)

Contenu

- 1 - Panorama de l'infiniment petit
- 2 - Les particules et leurs signatures
- 3 - Les instruments : machines et détecteurs
- 4 - 100 ans d'exploration

CHAPITRE I

Mars 2007, Ch. de la Vaissière, F.Hubaut, O. Leroy, J. Cogan

Panorama de l'infiniment petit

Plan

- 1 - Unités et ordres de grandeur
- 2 - Pourquoi faut-il des hautes énergies ?
- 3 - Plongée dans l'infiniment petit
- 4 - Autres formes de matière
- 5 - Les interactions
- 6 - Les préoccupations des physiciens


§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

Un monde extrême

- Avant de plonger dans l'infiniment petit, il convient de fixer des échelles dans le temps et dans l'espace
- Les unités usuelles sont inadaptées
- Il faut changer repères et habitudes


§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

Longueurs



- Les dimensions des atomes sont de l'ordre de l'**angström**, soit 10^{-10} m ou un dixième de nanomètre ou un dix-millième de micron

➤ Un milliard d'atomes = 10 cm



- La dimension d'un proton, composant du noyau, est de l'ordre du femtomètre ou **fermi**, soit 10^{-15} m

➤ Un milliard de protons = 1 μ m



§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

Les vitesses

- Vitesse limite: la vitesse de la lumière dans le vide

- ▶ $c = 299792,458 \text{ km /s}$
- ▶ rien ne peut aller plus vite
- ▶ la lumière met 8 minutes pour venir du Soleil



$c = 300\,000 \text{ km /s}$


- A l'intérieur des protons, les vitesses des corpuscules comme les quarks s'approchent de la vitesse de la lumière

- ▶ Il en est de même pour toutes les particules produites dans les collisions de haute énergie



v entre $0.1 c$ et c

- Les électrons d'un atome sont loin d'être aussi rapides, mais leur vitesse reste très grande




v environ $0.01 c$


§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

Les échelles de temps

- Pour traverser un minuscule atome, la lumière met une fraction de milliardième de milliardième de seconde



- En une seconde, un électron animé d'une vitesse de 3000 km / s (le centième de la vitesse de la lumière) fait à peu près autant de tours de son atome qu'un milliard d'hommes auront de battements de cœur pendant un siècle.
- Les fréquences des phénomènes qui agitent les quarks à l'intérieur de la matière nucléaire sont encore beaucoup plus élevées



§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

La multitude et le nombre d'Avogadro

- La contrepartie de l'extrême petitesse des atomes est leur très grand nombre.
- Dans un centimètre cube d'eau, il y a autant d'atomes d'oxygène et d'hydrogène que de gouttelettes d'eau dans la Méditerranée.
 - Visiter l'atome, c'est en quelque sorte passer de l'échelle de la Méditerranée à celle d'une goutte d'eau



- Nombre d'Avogadro
 - Nombre d'atome dans 12 g de carbone 12 (def de la mole)

$$N = 6.022 \cdot 10^{23}$$



§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

Les énergies

- Elles sont à la fois infimes, car elles concernent de minuscules corpuscules ...
- ...et **très importantes à leur échelle**,
 - car ces corpuscules circulent à des vitesses proches de celle de la lumière.
 - ex.: **1 TeV** (LHC) = énergie cinétique d'un moustique en vol. Ici concentrée dans un volume mille milliards de fois (10^{-12}) inférieur au moustique
- Les énergies en jeu deviennent énormes, dès qu'un grand nombre de corpuscules ou de noyaux sont impliqués :
 - explosion nucléaire
 - réacteurs
- Fission atome uranium 235 : réaction en chaîne
 - Énergie libérée par une fission: $\Delta mc^2 = 3.2 \cdot 10^{-11} \text{ J}$
 - Dans 1 gramme d' U_{235} : $N = 6.022 \times 10^{23} / 235$ noyaux



Energie libérée:

$8.2 \cdot 10^7 \text{ kJ/g d'U}_{235}$

ou 22800 kWh/g

NB : kJ/g = kilo Joule/gramme

§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

Unités d'énergie

- L'électronvolt (**eV**) est l'énergie acquise par un électron accéléré par une différence de potentiel de 1 Volt

- La charge de l'électron valant $1.6 \cdot 10^{-19}$ Coulomb,

$$1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Joule}$$

- Une unité qui marie l'infiniment petit (la charge de l'électron) et la physique usuelle (le Volt)
- Cette minuscule unité est adaptée aux phénomènes moléculaires et chimiques...
 - Les énergies de liaisons des électrons externes des atomes sont de l'ordre de l'électronvolt
- ... mais pas aux énergies mises en jeu en physique des particules
- On utilise fréquemment le **GeV**, le milliard d'électron-Volt ou «Giga électronvolt»...

$$1 \text{ GeV} = 1.6 \cdot 10^{-10} \text{ Joule}$$

- Le GeV correspond grosso-modo à l'énergie des quarks et gluons présents dans un proton
- ... ou le TeV (LHC) : «Téra électronvolt»

§ 1.1 - Unités et ordres de grandeur

Les comportements

- Dans l'infiniment petit où les extrêmes se côtoient, les lois de la physique usuelle présentent des aspects inhabituels.
- On étudie des phénomènes où entrent en jeu quelques corpuscules élémentaires ...
- ...alors que les objets de la vie courante sont composés d'une quasi-infinité de corpuscules élémentaires.
 - ▶ Les phénomènes à notre échelle sont collectifs.
- L'étude des interactions de corpuscules «individuels» met en lumière que :
 - ▶ Des **corpuscules** se comportent aussi comme de minuscules **ondes**
 - ▶ Ces ondes-corpuscules sont soumises à des «**quantifications**»
 - **La charge électrique est multiple d'une charge élémentaire**
 - **Les énergies des électrons dans un atome sont discontinues et imposées.**

§ 1.2 - Pourquoi faut-il des hautes énergies ?

Deux raisons principales



- Sonder la matière à des échelles de plus en plus petites
 - Les accélérateurs jouent le rôle de microscopes
- Produire de nouvelles formes de matière coûteuses en énergie
 - Recréer des particules très instables

§ 1.2 – Pourquoi faut-il des hautes énergies ?

Voir de plus en plus petit...

- Exemple de la lumière
- Le produit de l'énergie E par la longueur d'onde λ est une constante

$$E \lambda = 1.24 \cdot 10^{-6} \text{ eV.m}$$





Avec des photons d'énergie donnée on ne peut pas sonder des détails plus petits que λ

§ 1.2 – Pourquoi faut-il des hautes énergies ?

Voir de plus en plus petit... (suite)

■ L'aspect ondulatoire est général

- ▶ Comme la lumière, on peut représenter tout corpuscule comme une onde
- ▶ Découverte de Louis de Broglie



Louis de Broglie (1892-1987)

■ Double aspect corpusculaire et ondulatoire

- ▶ Par exemple : On observe des effets d'interférence avec des «particule» comme les électrons

■ Généralisation de la formule du photon :

A une particule d'impulsion P , est associée une longueur d'onde λ




$$\lambda(\text{m}) = 1.24 \cdot 10^{-15} / P(\text{GeV}/c)$$

- On ne peut voir que des détails de l'ordre de λ

§ 1.2 – Pourquoi faut-il des hautes énergies ?

... pour sonder la matière

- L'électron est un projectile idéal car ...
 - ▶ il peut être dirigée sur une cible
 - ▶ on réduit sa longueur d'onde en l'accélérant
 - ▶ il est « élémentaire »
- Avec un électron ou photon de 10 keV/c
 - $\lambda = 1.24 \cdot 10^{-10} \text{ m}$
 - ▶ exploration de l'atome
- Avec un électron de 1 GeV/c
 - $\lambda = 1.24 \cdot 10^{-15} \text{ m}$
 - ▶ L'électron voit un nucléon
- Avec un électron de 100 GeV/c
 - ▶ $\lambda = 1.24 \cdot 10^{-17} \text{ m}$
 - ▶ exploration du proton ou neutron (quarks)



**Plus on grimpe en énergie,
plus on sonde petit**

§ 1.2 – Pourquoi faut-il des hautes énergies ?

Produire de nouvelles particules

- Equivalence matière - énergie
- La production d'une particule de masse m requiert de l'énergie
 - ▶ Méthode simple des anneaux de collisions
 - ▶ Deux particules identiques, de même énergie E , allant en sens inverse et dont les quantités de mouvement P sont égales et opposées



- Pour produire m il faut ...

$$E + E > m c^2$$

- ▶ Il faut 2 fois plus d'énergie quand la particule m doit être produite par paires.
- Exemples historiques : il a fallu
 - ▶ SPEAR (1974) : 3.1 GeV pour produire une paire de quarks c
 - ▶ CLEO (1980) : 10.4 GeV pour produire une paire de quarks b
 - ▶ LEP (1990) : 92 GeV pour produire le boson Z^0
 - ▶ Tévatron (1995) : 1.4 TeV pour produire le quark top

§ 1.3 - Plongée dans l'infiniment petit


Brève revue de la matière qui nous entoure et de ses constituants

- **Atomes** : « insécable » en grec quelque chose que l'on ne peut découper en morceaux
- On est loin du compte ...
- Un jeu de poupées russes
 - Molécules
 - atomes
 - noyaux
 - nucléons (neutrons et protons)
 - quarks


§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Molécules

- Les molécules sont des assemblages d'atomes
 - ▶ Molécule la plus simple: H_2
 - ▶ Molécule la plus complexe (ADN), contient des milliers d'atomes
- La dimension des molécules va de quelques dixièmes de nanomètre à ... un mètre
 - ▶ Un ADN déplié atteint le mètre
- Les atomes tiennent ensemble en partageant des électrons
 - ▶ Liaisons chimiques = mise en commun d'électrons
 - ▶ Exemple de la molécule d'hydrogène $H_2 \rightarrow 2$ électrons




- ▶ Exemple de la molécule d'eau $H_2O \rightarrow 10$ électrons
 - 6 pour l'oxygène (couches internes)
 - 2 partagés entre O et le 1^{er} H
 - 2 partagés entre O et le 2nd H



§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Atomes

- Atome = insécable en grec (atomos)
- La dimension typique d'un atome est le dixième de nanomètre (10^{-10} m)
- Mais à cette échelle, ce n'est presque que du vide
 - ▶ "L'atome, c'est comme un pépin de mandarine sur l'obélisque de la Concorde avec des poussières tournant autour de la place" (Frédéric Joliot-Curie).
 - ▶ Toute la matière, ou presque, se retrouve concentrée dans un minuscule **noyau**
 - minuscule: cent mille fois plus petit (10^{-15} m)
 - dense: comporte presque toute la masse
 - ▶ Le reste, c'est du **vide** où circulent des **électrons** deux mille fois plus légers : 99.97% de la masse d'un atome est dans son noyau.
 - ▶ Si on supprimait le vide qu'il y a autour des noyaux des atomes, la Terre pourrait tenir dans une sphère de seulement 180 m de rayon !



Le modèle planétaire: un système solaire miniature, un sigle trompeur...



Image due à Rutherford en 1911.
Mais les électrons ne décrivent pas des orbites immuables, ils se partagent des territoires.

§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Le cortège électronique des atomes


■ Modèle de Bohr

- ▶ seules certaines « orbites » sont permises
- ▶ ces orbites correspondent à des niveaux d'énergie



■ Les électrons sont des objets

- ▶ à la fois ondes et corpuscules
- ▶ décrit par des fonctions d'onde
- ▶ il ne peuvent pas être localisés infiniment précisément



§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Diversité atomique

- L'atome est électriquement neutre:
 - ▶ le noyau est chargé positivement.
 - ▶ les électrons, chargés négativement, compensent la charge électrique du noyau.

- La charge du noyau détermine:
 - ▶ Le nombre d'électrons
 - ▶ le caractère des liaisons atomiques
 - ▶ le type d'élément chimique

Etat physique du corps simple(25°C, 1 atm)		SOLIDE					LIQUIDE				GAZEUX				SYNTHESE						
		* Lanthanides		Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu				
		# Actinides		Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr				
	1																18				
1	H																	He			
	1	2														13	14	15	16	17	2
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne			
	3	4														5	6	7	8	9	10
3	Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al	Si	P	S	Cl	Ar			
	11	12	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe			
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54			
6	Cs	Ba	La*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn			
	55	56	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86			
7	Fr	Ra	Ac#	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt												
	87	88	89	104	105	106	107	108	109												


§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Noyaux

- Les noyaux sont constitués de **protons et de neutrons**.
 - ▶ Les protons sont chargés positivement.
 - ▶ Les neutrons sont électriquement neutres.
 - ▶ Protons et neutrons sont appelés **nucléons**.
- Pour maintenir l'ensemble il faut une force très intense, qui l'emporte sur la répulsion électrostatique des protons
 - ▶ Cette « colle » est la **force nucléaire**. Elle ne se fait pas sentir en dehors du noyau.
- Les noyaux varient de 1 à 238 nucléons:
 - ▶ Noyau le plus simple : H = 1 proton
 - ▶ Noyau léger : ^{16}O = 8 protons, 8 neutrons
 - ▶ Noyau lourd : ^{238}U = 92 protons, 136 neutrons



Noyau d'hydrogène




Noyau lourd

- Isotopes:
 - ▶ noyau avec le même nombre de protons (et donc d'électrons)
 - ▶ mêmes propriétés chimiques
 - ▶ nombre de neutrons différents
 - ▶ exemple:
 - ^{14}C : isotope radioactif du ^{12}C

§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Stabilité nucléaire

- Les noyaux stables
 - ▶ comportent à peu près autant de neutrons que de protons
- Certains noyaux sont instables
 - ▶ se désintègrent spontanément
 - ▶ 3 types:
 - α : émission d'un noyau d'hélium
 - β : émission d'un électron et d'un neutrino
 - γ : rayon gamma (très énergétique)



§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Protons et neutrons

- Proton et neutrons sont les composants du noyau
 - ▶ Ils se ressemblent beaucoup
 - ▶ Protons chargés positivement, neutrons neutres.
 - ▶ Charge du proton = unité de charge élémentaire
- Le proton est stable : sa durée de vie est quasi infinie ($>10^{34}$ années !!)
- Libre, le neutron est instable
 - ▶ Sa durée de vie est environ de 15 minutes ... une éternité en physique des particules
 - il se désintègre spontanément (désintégration β):
 - neutron \rightarrow proton + électron + neutrino
 - ▶ A l'intérieur du noyau, le neutron est stable
 - « il n'a pas la place pour se désintégrer »
 - ▶ Il est produit dans les réacteurs nucléaires
 - ▶ C'est un projectile de choix pour briser les noyaux :
 - Il n'est pas repoussé par la charge électrique
 - son intrusion peut rompre l'équilibre délicat des nucléons et rendre le noyau instable

PROTON

$$\begin{aligned} Q &= e = 1.60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \\ m &= 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \\ R &= 10^{-15} \text{ m} \end{aligned}$$

$$E = mc^2$$

soit 938 millions d'électronvolts
ou 0.938 GeV

NEUTRON

$$\begin{aligned} Q &= 0 \\ m &= 1.68 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \\ R &= 10^{-15} \text{ m} \end{aligned}$$


$$E = mc^2$$

soit 940 millions d'électronvolts
ou 0.940 GeV

§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit


Protons et neutrons

- Les briques ultimes des protons et neutrons sont des corpuscule appelés **quarks**
- Il y a 2 espèces de quarks dans les nucléons:
 - ▶ **up** (noté u) : charge $2/3$
 - ▶ **down** (noté d) : charge $-1/3$
- Proton = 2 quarks up et un quark down



$$Q = 2e/3 + 2e/3 - e/3 = e$$

- Neutron = 2 quarks down et un quark up




$$Q = 2e/3 - e/3 - e/3 = 0$$

§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Les quarks up et down

- Les espèces « Up » et « Down » sont principalement distinguées par une valeur différente de la charge électrique: $2/3$ et $-1/3$
- Les quarks, qui interagissent principalement en échangeant des ondes appelées **gluons**, restent prisonniers dans les nucléons.




- Les quarks ont deux sens de rotation interne (appelé **spin**)




§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Quarks up et down (suite)

- Chaque quark existe sous trois formes différentes, selon sa charge propre à l'interaction forte
 - Cette charge est appelée **charge de couleur**



- Les quarks sont dotés de deux autres charges
 - Charge électrique
 - Charge responsable des **forces faibles**




Les quarks disposent de trois cordes à leur arc (interactions) pour interagir avec d'autres corpuscules

§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Leptons

- Seuls les quarks sont sensibles à l'interaction forte. Ils forment les « **hadrons** » (fort en grec)
- Par opposition, les autres particules de matière sont des « **leptons** »
 - ▶ Elles ne portent pas de charge de couleur = blanches
- L'électron et son neutrino sont des leptons
- L'**électron** ne dispose que des interactions électromagnétiques et faibles pour interagir.
- Le **neutrino** est un lepton dépourvu de charge électrique : il ne lui reste que la force faible.



Pour interagir avec la matière, l'électron dispose de charges électrique et «faible» et le neutrino d'une charge «faible»

§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Les neutrinos

- Les neutrinos sont très différents des autres particules car ils interagissent très peu
 - Pas de charge électrique
 - Pas de charge de couleur
- Particules les plus énigmatiques (**fantômes**)
- Très difficiles à détecter
- Leurs masses sont extrêmement petites

$$M(\text{neutrino-e}) c^2 < 0.0000000002 \text{ GeV} = 2\text{eV}$$

- Les accélérateurs, les réacteurs, le soleil sont des sources de neutrinos



Réacteurs



Soleil




- Les neutrinos sont l'objet de nombreuses expériences, ils intriguent et fascinent beaucoup !

§ 1.3 – Plongée dans l'infiniment petit

Panorama de la matière ordinaire

- A l'échelle la plus élémentaire, une famille de **quatre** corpuscules constitue la matière qui nous entoure.
- Le membre le plus connu en est **l'électron**, pourvu d'une charge électrique négative, qui tourne autour du noyau des atomes.
- Ensuite, les noyaux sont constitués de protons et de neutrons, dont les briques élémentaires sont des **quarks** « **up** » et « **down** ».



- Le quatrième membre de cette famille est une particule furtive, interagissant très peu, le **neutrino**-électron.
- Ces particules de matière sont appelées **fermions** (elles sont un spin $\frac{1}{2}$)



§ 1.3 - Autres formes de matière

Il existe d'autres formes de matière que celle qui nous entoure

- Nouvelles espèces de quarks et de leptons
- Antimatière
- Assemblages instables de quarks

§ 1.3 – Autres formes de matière

Nouveaux quarks et leptons


- Les quarks up et down, l'électron et le neutrino forment une famille
 - Celle des constituants de la matière «ordinaire»
- **Deux nouvelles familles** de corpuscules élémentaires ont été découvertes.
 - parentés remarquables et inexplicables avec les quarks up et down, l'électron et le neutrino.
- La seconde famille lourde et instable comprend 4 éléments :
 - un quark de charge $2/3$ et un quark de charge $-1/3$, parents des quarks up et down
 - Un lepton de charge -1 , parent de l'électron
 - Un lepton neutre, parent du neutrino ordinaire
- La troisième famille, encore plus lourde et instable, comprend aussi 4 corpuscules :
 - 2 quarks de type up et down plus 2 leptons
- Tous ces corpuscules étaient présents lors du big bang.
 - Les grands accélérateurs de particules font revivre ces dinosaures

Au total :
trois familles ou générations

§ 1.3 – Autres formes de matière

Familles de quarks...

- Chaque quark a trois variantes équivalentes
 - ▶ Ex: up-rouge, up-bleu et up-vert
- La seconde famille est lourde et instable
 - ▶ Quark « s ou étrange » parent du quark d
 - ▶ Quark « c ou charmé » parent du quark u
- La troisième famille est encore plus lourde et instable
 - ▶ Quark « b ou de beauté » parent du quark d
 - ▶ Quark « t ou top » parent du quark u

	quarks
<i>Up</i>	
<i>Down</i>	
<i>Strange</i>	
<i>charm</i>	
<i>Beauty</i>	
<i>top</i>	

§ 1.3 – Autres formes de matière


... et familles de leptons

- Le **muon** (μ): électron lourd de la seconde famille
 - Dépourvu de charge forte: interagit comme l'électron
- Le **neutrino- μ** : une seconde espèce de neutrino
 - Un muon qui a perdu sa charge électrique
- le **tau** (τ): l'électron super-lourd de la troisième famille
 - Dépourvu de charge forte: interagit comme l'électron
- Le **neutrino- τ** : une troisième espèce de neutrino
 - Un tau qui a perdu sa charge

	leptons
<i>Electron</i>	
<i>Muon</i>	
<i>Tau</i>	
ν_e	
ν_μ	
ν_τ	

§ 1.3 – Autres formes de matière

Panorama des fermions



LEPTONS

Peuvent se déplacer librement.

QUARKS

Pisonniers de particules plus grandes ils ne sont pas observés individuellement.


FERMIONS

La matière ordinaire est composée de particules de ce groupe.

<p>Première Famille</p>	<p>électron Responsable de l'électricité et des réactions chimiques. Sa charge est -1.</p> 	<p>neutrino électron Sans charge électrique et interagissant très rarement avec le milieu environnant.</p> 	<p>bas (down) Sa charge électrique est -1/3. Le proton en contient un, le neutron deux.</p> 	<p>haut (up) Sa charge électrique est +2/3. Le proton en contient deux, le neutron un.</p> 
	<p>muon Un compagnon plus massif de l'électron.</p> 	<p>neutrino muon Propriétés similaires à celles du neutrino électron.</p> 	<p>étrange (strange) Un compagnon plus lourd du "bas".</p> 	<p>charme (charm) Un compagnon plus lourd du "haut".</p> 
	<p>tau Encore plus lourd.</p> 	<p>neutrino tau Propriétés similaires à celles du neutrino électron.</p> 	<p>beauté (beauty) Encore plus lourd.</p> 	<p>sommet (top) Le dernier quark observé (en 1994)</p> 

Pour la plupart, ces particules étaient présentes juste après le big bang.

§ 1.3 – Autres formes de matière



Anti-matière

- L'anti-matière est constituée d'anti-particules
- Une anti-particule a exactement la même masse que la particule correspondante, mais des nombres quantiques (charge électrique, charge de «couleur», charge «faible») opposés.
 - ▶ Par exemple, l'anti-électron ou positron a une charge électrique positive et de même amplitude que l'électron.




electron



Positron

- Il existe aussi un antiproton,
 - ▶ Fabriqué avec des anti-quarks
 - portant des « anti-couleurs »
 - ▶ La charge électrique de l'anti-proton est négative



Antiproton

$$Q = -2e/3 - 2e/3 + e/3 = -e$$

- En combinant anti-protons, anti-neutrons et anti-électrons, il est possible de faire des anti-atomes. Des atomes d'anti-hydrogène ont déjà été produits.

§ 1.3 – Autres formes de matière

Date des découvertes

- Electron : 1897
- Proton : 1919
- Neutron : 1932
- Positron : 1933
- Muon : 1937
- Neutrino-e : 1956
- Neutrino- μ : 1962
- Quarks up, down et étrange : 1964
 - ▶ Cette date correspond à l'hypothèse de leur existence. Cette existence ne sera vraiment confirmée qu'en 1974.
- Quark -c ou quark charmé : 1974
- Quark-b ou quark de beauté : 1977
- Tau : 1975
- Quark top : 1995

**Des découvertes
étalées sur un siècle**

§ 1.4 - Les interactions


Quatre grands types de forces sont à l'œuvre dans la nature

- A l'aspect granulaire de la matière, correspond un aspect « granulaire » des forces.
- La compréhension du mécanisme des forces est un des objets de la physique des particules
- Interaction : terme plus général que forces
 - ▶ Attraction/répulsion
 - ▶ Création/annihilation de matière

§ 1.4 – Les interactions

Les quatre interactions


- Tous les processus physiques, chimiques ou biologiques connus peuvent être expliqués à l'aide de seulement quatre interactions fondamentales :
 - l'**interaction gravitationnelle**, responsable de la pesanteur, de la marée ou encore des phénomènes astronomiques,
 - l'**interaction électromagnétique**, responsable de l'électricité, du magnétisme, de la lumière ou encore des réactions chimiques et biologiques,
 - l'**interaction forte**, responsable de la cohésion des noyaux atomiques,
 - l'**interaction faible**, responsable de la radio-activité beta, qui permet au Soleil de briller.



§ 1.4 – Les interactions

Interactions collectives

- Ce que nous appelons "force" résulte d'une quasi infinité de minuscules interactions



- L'attraction du satellite et de la terre est la somme au cours du temps d'une myriade **d'attractions individuelles** entre les atomes des deux objets

§ 1.5 – Les interactions

Interactions et messagers

- Les interactions individuelles sont expliquées comme l'échange entre particules de matière de particules de rayonnement.
- Principe d'action-réaction : interaction à distance entre les deux barques par échange d'un objet intermédiaire (le ballon). Cet objet est appelé le **vecteur de l'interaction**.




- De même, en physique des particules, toute interaction entre particules est expliquée par l'échange de vecteurs
- Ces vecteurs sont eux-même des particules. Ce sont des **bosons** (particules de spin entier, par opposition aux fermions)

§ 1.5 – Les interactions

Les bosons-vecteurs

- Les bosons vecteurs des 4 interactions sont :
 - ▶ Le **photon** pour l'interaction électromagnétique
 - ▶ Les **gluons** pour l'interaction forte
 - ▶ Les bosons **W^+ , Z^0 et W^-** pour l'interaction faible.
 - ▶ Le **graviton** pour l'interaction gravitationnelle




- Plus le ballon est lourd, plus il sera difficile aux occupants du bateau de le lancer loin : les bateaux ne pourront plus interagir au-delà d'une certaine distance.
- De même, en physique des particules, plus la particule vecteur d'une interaction sera lourde, plus cette interaction sera de courte portée.

§ 1.5 – Les interactions

Charges et messagers

- La capacité d'interaction des particules est représentée par leur "charge" :
 - La charge électrique pour l'interaction électromagnétique
 - La charge de couleur pour l'interaction forte
 - La charge d'isospin pour l'interaction faible.
 - La masse pour l'interaction gravitationnelle




§ 1.5 – Les interactions

Invariants

- Considérons un système isolé
 - ▶ n'interagit pas (ne reçoit rien, n'envoie rien à l'extérieur)
- Quantités conservées
 - ▶ L'énergie
 - postulat: le temps est homogène
 - le résultat d'une expérience ne dépend pas du moment où elle est faite
 - ▶ La quantité de mouvement
 - postulat: l'espace est homogène
 - le résultat d'une expérience ne dépend pas de l'endroit où elle est faite
 - ▶ Le moment angulaire
 - postulat: l'espace est isotrope (pas de direction privilégiée)
 - le résultat d'une expérience ne varie pas si on effectue une rotation globale

- Exemple: un système de 2 particules en interaction:



- L'énergie, la quantité de mouvement, le moment

§ 1.5 – Les interactions

Transformations discrètes

- La Parité (P)
 - ▶ symétrie miroir
 - ▶ Lois de la physique sont-elles invariantes par parité ?
- La conjugaison de charge (C)
 - ▶ renversement des charges
 - charge électrique + devient -
 - couleur devient anti-couleur
 - ...
 - ▶ particule devient son anti-particule
 - ▶ Les lois de la physique sont elles les mêmes pour la matière et l'anti-matière ?
- Le renversement du temps (T)
 - ▶ on inverse le sens du temps
 - on regarde le film à l'envers !
 - ▶ Les lois de la physique sont elles les mêmes pour la matière et l'anti-matière ?
- Et les combinaisons ?
 - ▶ CP
 - l'anti-matière vu dans un miroir se comporte-elle comme la matière ?
 - ▶ CPT
 - Principe très fort, lié à la conservation de l'énergie
 - Les lois de la physique doivent-êtré invariantes lorsqu'on applique la transformation CPT.

§ 1.5 – Les interactions


Loi de conservation

- ▣ Nombres quantiques internes:
 - Les particules sont caractérisées par leurs propriétés intrinsèques
 - Les particules élémentaire sont des objets quantiques
 - Leurs propriétés internes sont définies par des **nombres quantiques**:
 - les charges (électriques, de couleurs, faibles)
 - le spin (moment angulaire propre = $\frac{1}{2}$ pour les fermions)
 - la saveur (c.à.d. le type - u,d,s,c,b,t - e, μ , τ , ν_e , ν_μ , ν_τ)
 - ...


- ▣ Les interactions sont caractérisées par:
 - leur capacités à modifier (ou non) certains des nombres quantiques internes des particules

▣ Exemples:

- interaction où la saveur est conservée:



- interaction où la saveur est perdue:



désintégration β

§ 1.5 – Les interactions

Caractérisation:

Comment caractériser une interaction ?


Qu'est-ce qui différencie les différents types d'interaction ?

- Médiateurs:
 - ▶ bosons vecteurs
- Charge:
 - ▶ bosons vecteurs agit sur des charges
- Portée:
 - ▶ donnée par la masse du boson vecteur en jeu
- Intensité:
 - ▶ couplage entre le boson et le fermion
- Transformations discrètes (C,P,T):
 - ▶ symétries pour certaines interactions
- Quantités conservées:
 - ▶ les nombres quantiques respectées ou ignorées

§ 1.5 – Les interactions

Les deux types d'interactions élémentaires


- Un premier type d'interaction : l'**échange** de bosons-vecteurs
 - ▶ Lors de l'échange, de l'énergie et un certain nombre de caractéristiques physiques sont transférées d'une particule à l'autre.



Exemple de l'Interaction faible: échange entre un quark up et un neutrino

- Un second type d'interaction : la création ou la destruction de particules,
 - ▶ Ces créations et annihilations passent par l'intermédiaire des mêmes bosons-vecteurs (gluons, photons, bosons W)

Gluon \longleftrightarrow Quark-antiquark



Exemple de la matérialisation d'un gluon en un quark et antiquark: la réaction est réversible

§ 1.5 – Les interactions


Matérialisation...

- Avec de l'énergie on peut créer des particules

$$E = mc^2$$



- Le phénomène devient important à hautes énergies
 - Il explique le grand nombre de particules produites
- La matérialisation la plus économique est celle d'un photon gamma au voisinage d'un noyau
 - Le gamma doit avoir une énergie supérieure à 1,022 MeV
 - 1,022 MeV = 2x la masse de l'électron




§ 1.5 – Les interactions

...et annihilation

- Une particule et une antiparticule peuvent s'annihiler en un boson.
 - ▶ Réaction inverse de la matérialisation d'une onde en particule et antiparticule.
- L'annihilation de matière libère beaucoup d'énergie, la formule de l'énergie de masse faisant intervenir le carré de la vitesse de la lumière.
 - ▶ L'énergie se retrouve finalement sous forme d'énergie cinétique
- Annihilation et matérialisation de particules jouent un rôle important en physique des particules.

Gluon \longleftrightarrow Quark-antiquark




Exemple de matérialisation à l'intérieur de la matière nucléaire: Un gluon se matérialise en quark et antiquark up. Le processus inverse est l'annihilation d'une paire quark-antiquark up en un gluon.

§ 1.5 – Les interactions

L'interaction électromagnétique




- L'interaction électromagnétique s'exerce sur tous les corpuscule élémentaires, à part les neutrinos et antineutrinos.
- Elle est à longue portée et domine à l'échelle de l'atome.
 - ▶ Ses manifestations dans la vie courante sont les forces électriques et magnétiques.
- La lumière est un type particulier d'onde électromagnétique.
- La **charge électrique** est à l'origine des interactions électromagnétiques.
- Les **photons** en sont les messagers .




Exemple de l'échange d'un photon entre deux corpuscules chargés

§ 1.5 – Les interactions

L'interaction forte et nucléaire



- Cette interaction très intense s'exerce sur les quarks et les gluons.
- De courte portée (10^{-15} m), elle ne s'exerce qu'à l'intérieur des noyaux : elle permet la cohésion atomique.
- Elle se manifeste également par la durée de vie extraordinairement brève de la plupart des «hadrons».
- Une charge spéciale (appelée **couleur**) est à l'origine des interactions fortes.
- Les **gluons** en sont les messagers.




Exemple d'échange d'un gluon entre un quark et antiquark

§ 1.4 – Les interactions

Assemblages de quarks


- La théorie de l'**interaction forte** (QCD) montre que les quarks ne peuvent jamais être libres : il n'est donc pas possible d'observer un quark seul.
- Les quarks sont donc toujours confinés à l'intérieur de particules composites appelées **hadrons**.
 - ▶ « les quarks s'habillent pour sortir »
- Comme les quarks sont « colorés » (porteurs d'une charge de couleur), on dit qu'on ne peut pas observer d'objets colorés, mais seulement des objets blancs. Les hadrons sont « blancs ».
 - ▶ « le vide est opaque à la couleur »
- On distingue deux catégories de hadrons :
 - ▶ Les **mésons**, des hadrons formés d'un quark et d'un anti-quark
 - ex: bleu + anti-bleu = blanc
 - ▶ Les **baryons**, des hadrons formés de trois quarks, comme les protons ou les neutrons
 - ex: bleu + vert + rouge = blanc
 - ▶ C'est la seule possibilité de faire des assemblages blancs.



§ 1.4 – Les interactions

Assemblages de quarks et d'antiquarks: Mésons

- Méson : assemblage quark-antiquark




- Liés par interaction forte (gluons)
- Matière et antimatière en présence
 - ▶ Forte instabilité
- Une grande variété de temps de vie
 - ▶ Mort par interaction forte : 10^{-20} à 10^{-23} s
 - ▶ Mort « électromagnétique » : 10^{-8} à 10^{-15} s
 - ▶ Mort par interaction faible : 10^{-8} à 10^{-13} s
- Produits en abondance
 - ▶ Dans les collisions on produit beaucoup plus de mésons que d'électrons ou de protons, mais ils disparaissent en quelques microsecondes
- Mésons les plus fréquents et importants
 - ▶ Pions (chargés et très fréquents)
 - ▶ Pi-zéro ou neutre (Source de γ énergiques)
 - ▶ Kaons chargés
 - ▶ Kaons neutres (désintégrations intéressantes)

§ 1.4 – Les interactions

baryons ou assemblages de 3 quarks


- On peut assembler aussi trois quarks...
 - ▶ Ils sont de «couleurs» différentes et liés par des gluons
- Une grande variété de temps de vie
 - ▶ Mort par interaction forte : 10^{-20} à 10^{-23} s
 - ▶ Mort « électromagnétique » : 10^{-8} à 10^{-15} s
 - ▶ Mort par interaction faible : 10^{-8} à 10^{-13} s
- Le proton et le neutron sont les baryons les plus stables et **ils sont même stables**...
 - ▶ Pas de coexistence avec l'antimatière
 - ▶ Nous devons notre existence à cette stabilité
- Quelques baryons relativement stables : les hypérons, porteurs du quark appelé étrange
 - ▶ Lambda ou Λ (1 quark s)
 - ▶ Sigma ou Σ (1 quark s)
 - ▶ Ksi ou Ξ (2 quark s)
 - ▶ Grand Oméga ou Ω (3 quark s)



§ 1.5 – Les interactions

L'interaction faible

- L'interaction faible, la plus difficile à mettre en évidence, se manifeste dans la nature par :
 - ▶ la radioactivité bêta : émission d'électrons ou de positrons par certain noyaux
 - ▶ Elle contribue pour 10% à l'énergie du soleil
- Elle agit sur toutes les particules
- Elle est véhiculée par des messagers extrêmement massifs: **les bosons W^+ , Z^0 et W^-** .
- Sa portée est donc quasi nulle (10^{-18} m), ce qui explique sa "faiblesse" apparente.



Exemple d'échange d'un boson **W** entre un **quark up** venant de la gauche et un **électron** venant de droite. Le quark up devient quark **down** et l'électron **neutrino**.


§ 1.5 – Les interactions

L'interaction gravitationnelle

- Bonne dernière à l'échelle corpusculaire, c'est la force dominante à notre échelle.
- En effet, la masse joue le rôle de la charge. Comme il n'existe pas de masse négative, la gravitation est **toujours attractive**.
- Au contraire, la portée des autres forces est limitée par l'existence de systèmes neutres.




Dans un atome les charges électriques positives et négatives se compensent. A grande distance attractions et répulsions s'annulent.



Pas de charge , pas de portée.




- Toutes les attractions élémentaires s'ajoutent, si bien que des forces indécélables à l'échelle de l'infiniment petit l'emportent sur les autres forces à l'échelle cosmique.



§ 1.5 – Les interactions

Intensité et portée

- **Interaction forte :**
 - ▶ Intense mais confinée à l'intérieur des assemblages de quarks (faible portée, 10^{-15} m)
- **Interaction électromagnétique :**
 - ▶ 100 fois plus faible, portée infinie
- **Interaction faible:**
 - ▶ 10^7 fois plus faible, très courte portée (10^{-18} m).
- **Gravitation**
 - ▶ A l'échelle corpusculaire, 10^{36} fois plus faible.
 - ▶ Mais force dominante à notre échelle.



Nom de la force	Electro-magnétique	Forte	Faible	Gravitationnelle
Domaine d'action	Atomique, Moléculaire, Echelle humaine	Nucléaire, Subnucléaire	Nucléaire, Subnucléaire	Echelle humaine, Astronomie
Portée	Infinie	Quelques Fermis	Quelques centièmes de Fermi	Infinie
Charge associée à la force	Electrique	Couleur	Faible,	Masse ou énergie
Messenger de la force	Photon	Gluon	Bosons faibles	Graviton (non observé)
Durée de vie caractéristique	10^{-17} s. (π^0)	10^{-23} s. (ρ)	10^{-6} s. (μ)	Infinie

§ 1.5 – Les interactions

Panorama des particules

MATIÈRE

ATOME

NOYAU

PROTON

LEPTONS

Peuvent se déplacer librement.

QUARKS

Prisonniers de particules plus grandes
ils ne sont pas observés individuellement.

<p>FERMIONS</p> <p>La matière ordinaire est composée de particules de ce groupe.</p>	Première Famille	<p>électron</p> <p>Responsable de l'électricité et des réactions chimiques. Sa charge est -1.</p> 	<p>neutrino électron</p> <p>Sans charge électrique et interagissant très rarement avec le milieu environnant.</p> 	<p>bas (down)</p> <p>Sa charge électrique est -1/3. Le proton en contient un, le neutron deux.</p> 	<p>haut (up)</p> <p>Sa charge électrique est +2/3. Le proton en contient deux, le neutron un.</p> 
<p>Pour la plupart, ces particules étaient présentes juste après le big bang.</p>	Deuxième Famille	<p>muon</p> <p>Un compagnon plus massif de l'électron.</p> 	<p>neutrino muon</p> <p>Propriétés similaires à celles du neutrino électron.</p> 	<p>étrange (strange)</p> <p>Un compagnon plus lourd du "bas".</p> 	<p>charme (charm)</p> <p>Un compagnon plus lourd du "haut".</p> 
	Troisième Famille	<p>tau</p> <p>Encore plus lourd.</p> 	<p>neutrino tau</p> <p>Propriétés similaires à celles du neutrino électron.</p> 	<p>beauté (beauty)</p> <p>Encore plus lourd.</p> 	<p>sommet (top)</p> <p>Le dernier quark observé (en 1994)</p> 


BOSONS

Particules fondamentales qui assurent la transmission des forces de la nature.

<p>photon</p> <p>Grain élémentaire de la lumière, porteur de la force électromagnétique.</p> 	<p>gluon</p> <p>Porteur de la force forte entre quarks.</p> 	<p>bosons vecteurs</p> <p>Porteurs de la force faible, responsables de certaines formes de désintégration radioactive.</p> 	<p>Graviton</p> <p>Pas encore observé. Supposé véhiculer la force de gravité.</p> 
---	--	--	--

ANTIMATIÈRE

A chaque particule-fermion correspond une antiparticule, espèce d'image miroir.



§ 1.6 - Les préoccupations des physiciens

Thèmes de recherche actuels


Voir plus petit et monter en énergie pour...

- La compréhension des masses
- Recherche de nouvelles particules et de nouveaux phénomènes
- Le pourquoi des générations
- L'élémentarité des quarks et des leptons
- Où est passée l'antimatière
- L'unification des forces
- Ondes gravitationnelles
- Comprendre la création de l'univers, le soleil, le Big-Bang

§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Pourquoi faire de la physique des particules ?

- Comprendre comment le mécanisme qui a donné naissance aux **particules**, leur donne une **masse**, les fait **interagir**....




NA50 ψ /DY(4.2-7.0)

§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Le pourquoi des masses?


■ La hiérarchie impressionnante des masses :

- ▶ Photon, neutrinos : ~ 0
- ▶ Electron : 0.0005111 GeV
- ▶ Quarks up et d : quelques 0.001 GeV
- ▶ Muon : 0.106 GeV
- ▶ Quark charmé : ~ 1.2 GeV
- ▶ Tau : 1.77 GeV
- ▶ Quark b : 4 GeV
- ▶ Boson W : 80 GeV
- ▶ Boson Z^0 : 92 GeV
- ▶ Quark top : 175 GeV



- Pourquoi? En particulier, pourquoi le quark top est-il si lourd?
- Hypothèse du rôle d'une particule :
 - ▶ le **boson de Higgs**


Mr Higgs



§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Le pourquoi des masses?

- Nouvelle particule de spin 0 : **le boson de Higgs**
- Les interactions entre particules élémentaires et boson de Higgs leur donnent une masse
- Double prédiction :
 - ▶ existence d'une nouvelle particule de spin 0,
 - ▶ existence d'une cinquième interaction fondamentale dont le médiateur est le boson de Higgs.
- La recherche du Higgs est encore vaine
 - ▶ Indication éventuelle à 115 GeV suggérée par le LEP en 2000
 - ▶ Recherche actuelle orientée particulièrement vers la vérification de cette double prédiction, au Tevatron et surtout au LHC.
- $M(\text{Higgs})$: une centaine à quelques centaines de GeV




§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Le boson de Higgs


- Sa masse est inconnue mais peut être contrainte par la théorie :

$70 \text{ GeV} < M_H < 700 \text{ GeV}$



- Recherches expérimentales :

$m_H = 114^{+65}_{-49} \text{ GeV}/c^2$
 $m_H < 260 \text{ GeV}/c^2 @ 95\%$



§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Le Zoo est-il complet?

■ Zoo des corpuscules connues à ce jour :


- ▶ 6 quarks (+ anti-particules)
- ▶ 6 leptons (+ anti-particules)
- ▶ 1 photon
- ▶ 8 gluons
- ▶ 3 bosons lourds : W^+ , W^- et Z^0



■ Ce Zoo est-il complet?

■ Découvrira-t-on de nouvelles particules lourdes?

- ▶ Zoo théorique:
 - **Bosons de Higgs**
 - **Particules super-symétriques**



■ Découvrir des terres inconnues ?

■ Indices de nouveaux phénomènes




Il faut de l'énergie et de grosses machines

§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Le pourquoi des générations

- Origine du phénomène de génération ?
- Combien de familles ? Le LEP a répondu: **3**
 - ▶ Hypothèse que les neutrinos sont légers, ce qui est le cas des trois familles connues.




- Pourquoi n'y a-t-il que 3 familles?
 - ▶ Une quatrième famille différente des 3 premières ?

§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Les quarks et les leptons sont-ils élémentaires?

- Poursuite de la quête de l'atome au sens des grecs : quelque chose que l'on ne peut couper
- On a exploré le proton actuellement à 10^{-18} m
 - ▶ C'est à dire que l'on serait capable de voir des détails de l'ordre du millième de sa taille
- De même, rayon de l'électron $< 10^{-18}$ m
 - **Seule solution : voir plus petit**
 - **Ceci demande des énergies encore plus élevées :**

$$\lambda(\text{m}) = 1.24 \cdot 10^{-15} / P(\text{GeV}/c)$$




- Verra-t-on aussi des quarks en liberté?

§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Où est passée l'antimatière?

- Où est passée l'antimatière dans l'Univers?
 - ▶ Sakharov a proposé le mécanisme de la «violation de CP»
- Minuscule différence entre matière et antimatière
 - ▶ Phénomène de la violation de CP
- Usines à B
 - ▶ «Le quark b» et son antiquark joueraient un rôle dans le mécanisme.
 - ▶ On cherche à produire en grande quantité les mésons B porteurs de ce quark pour le vérifier
 - ▶ Confirmation de la « violation de CP » par BaBar et Belle en 2001
- Existe-t-il des astres d'antimatière aux confins de l'univers?
 - ▶ Pas d'indications
 - ▶ Expérience sur satellite (AMS)
- Selon certains modèles, les protons et neutrons devraient se désintégrer dans quelques 10^{32} années
 - ▶ L'excès de matière aurait alors disparu
 - ▶ Pas d'indications à ce jour de ce phénomène



§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Forces unifiées?


■ Gravitation (Newton)

- ▶ Chute des corps et mouvement des astres = même phénomène, deux facettes d'une seule interaction.

■ Electricité et magnétisme

- ▶ En 1868, James Clerk Maxwell réunit l'électricité et le magnétisme.
- ▶ C'est l'électromagnétisme.

James Clerk Maxwell (1831-1879)



■ Forces électrofaibles



- ▶ Dans les années 1970, Glashow, Weinberg et Salam ont développé une théorie unique des interactions électromagnétiques et faibles (Prix Nobel 1979)
- ▶ Ils prédisent les bosons W^+ , W^- et Z^0
- ▶ La découverte de ces derniers a valu le prix Nobel à Carlo Rubbia et Simon Van de Meer (1984)

§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Forces unifiées?

- Recherche d'une unification des trois interactions (électromagnétique, faible et forte)


➡ Théorie de Grande Unification (GUT)



§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Et la gravitation ?



- La gravitation n'est pas une théorie quantique : elle n'est pas inclus dans le schéma précédent
 - ▶ Super-symétrie + théorie des cordes = super-cordes
- Le messenger de l'interaction de gravitationnelle serait une particule appelée “ **graviton** ”
 - ▶ Il n'a pas encore été mis en évidence.
 - ▶ Il se manifesterait sous formes d'ondes gravitationnelles produites par des événements cosmiques violents.
- De telles ondes sont recherchées, mais leurs effets sont extrêmement faibles.
 - ▶ Exemple : expérience VIRGO veut détecter au passage d'une onde gravitationnelle une variation relative de longueur de 10^{-21} = dimension d'un atome pour une distance terre-soleil!
- La gravitation est-elle toujours attractive? Quel
est le poids d'un antiproton?
 - ▶ Masse négative ? Imaginons un antiproton soumis à la seule gravitation terrestre : il tombe ou il monte?



§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Comprendre la création de l'Univers, les étoiles, le soleil...

- L'infiniment petit rejoint l'infiniment grand
- Expériences d'astroparticules
 - ▶ La Terre est bombardée de particules de hautes énergies venant du Cosmos (Noyaux, protons, photos, électrons, neutrinos)
 - ▶ Quelles sont les sources de ces «rayons cosmique»?
- Expériences neutrino:
 - ▶ Aller sous la terre, sous l'océan, aux pôles
- Etudes des gerbes cosmiques
 - ▶ Scruter l'origine des gerbes cosmiques: photon ou noyau
 - ▶ Pointer la direction du ciel d'où elle vient: étoile, galaxie, trou noir...
- Origine de la matière « noire » dans l'Univers
 - ▶ La matière visible ne rend pas compte de toute la matière et l'énergie présentes dans l'Univers. Hypothèse de particules massives.
 - ▶ Théorie du Big-Bang. Les étoiles les plus anciennes s'éloignent de plus en plus vite



§ 1.6 – Les préoccupations des physiciens

Défis technologiques

- Défis de machines
 - ▶ Construction de machines « mondiales » gigantesques pour atteindre plusieurs TeV
- Défis de précision
 - ▶ Recherche de phénomènes très ténus
 - ▶ Besoin de hautes luminosités
 - ▶ Besoin de hautes précisions pour détecter de nouveaux phénomènes
- Défis pour les détecteurs
 - ▶ Millions de voies d'électronique
 - ▶ Problèmes d'empilement
 - ▶ Déclenchements extrêmement rapides
- Défis de statistiques
 - ▶ Volumes énormes de données
- Equipes mondiales
 - ▶ Méga-expériences, durant 20 à 30 ans
 - ▶ centaines/milliers de chercheurs et techniciens
- En Astroparticules aussi...
 - ▶ Le projet AUGER couvre la Pampa argentine
 - ▶ Projets d'expérience embarquées sur satellites